

80 (40882). DE CALCULO SITUS
[1685 (?)]

Überlieferung: *L* Konzept: LH 35 I 14 Bl. 9 u. 16 u. LH 35 I 5 Bl. 40 u. 44. 2 Bog. 4°. 5 S.
Bl. 40 v° u. Bl. 44 leer.

5 Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist für 1685 belegt.

01-017 R

(1) Via determinata a puncto A ad punctum B , AB . vocatur *recta*. AB . via scilicet quae transit per puncta determinate se ad A et B habentia, minusque distantia ab A , quam A distat a B .

(2) Itaque recta est via minima, seu si C non sit in recta AB , erit via ab A ad B per
10 C major quam recta AB seu $AC + CB \sqsupset AB$. quoniam via minima ex positis extremis determinata est. Nam utique manifestum est viam maximam non esse determinatam, quia via ire potest per punctum datum quodcunque adeoque quacunque assumpta sumi potest major at viam non posse minorem assumi in infinitum, sunt enim puncta quae propiora sunt, itaque datur quaedam via minima.

01 top 15 (3) Duae quoque rectae inter A et B coincident seu si sit ACB via recta, et ADB via recta, erit $ACB \oslash ADB$. Alioqui utique ex punctis datis, via non esset determinata, cum incertum sit quae debeat eligi.

(4) Punctum quoque in recta sumtum est sui situs unicum ad duo puncta extrema seu ex datis punctis illis suoque ad ea situ determinatur. Itaque si sit in recta AB punctum
20 Y dico situm $Y.A.B$ esse determinatum. Itaque si daretur aliud punctum E sitque situs $E.A.B \infty$ (congruus) situi $Y.A.B$ sintque E et Y in recta AB . erit $E \oslash Y$ seu coincident E et Y .

(5) Situm autem puncti ad punctum determinare possumus per rectas inter ea

6–8 AB . via ... distat a B *erg. L* 9–15 per C | minor qvam recta AC seu $AC + CB \sqsupset AB$ *ändert Hrsg.* | (1) $\langle et \rangle C$ non est in AB (2) | qvoniam ... determinata est. (a) qvanqvam (aa) id fortasse osten (bb) haec demonstrari possit, sed nos eam sine demonstratione assum (b) nam ... via minima *erg.* | (3) Duae *L* 16 f. alioqvi ... eligi *erg. L* 19 determinatur. (1) Itaqve (2) Situm autem p u n c t i B a d a l i u d p u n c t u m A , determino per rectam a B ad A seu per BA . (3) itaqve *L* 19 f. punctum Y (1) dico et ita (2) dico (a) $Y. A. B$ esse situm (b) situm *L*

interceptas, eo ipso quia determinata est recta, ita situs E ad A dici potest EA .

(6) Recta rectae est similis seu $AB \sim CD$ et contra quae rectae similis est recta est quia similia sunt quae eodem modo determinantur. At ABC non statim simile est ipsi LMN , nisi constat prius eodem modo determinari seu in determinantibus nullum esse discrimen seu $AB \sim LM$ et $BC \sim MN$ et $AC \sim LN$.

01 mid

5

(7) Si duae rectae sint aequales, erunt congruae, seu si sit $AB = CD$ erit $AB \propto CD$. Nam $AB = CD$ ex hypothesi et $AB \sim CD$ per artic. praecedentem. Ergo per axioma articuli sequentis $AB \propto CD$.

(8) Axioma: Si duo sint similia et aequalia erunt congrua seu si $\odot = \mathfrak{D}$ et $\odot \sim \mathfrak{D}$ erit $\odot \propto \mathfrak{D}$.

10


(9) Si situs $E.A.B \propto$ situi $Y.A.B$. erit $E.A. \propto Y.A$.

(10) Si $E.A. \propto Y.A$. erit $EA = YA$ per artic. 5. et contra si $EA = YA$ erit $E.A. \propto Y.A$. Hoc intellige si E, A, Y sint puncta.

(11) Si $A.B \propto L.M$ et $A.C \propto L.N$ et $B.C \propto M.N$ erit $A.B.C. \propto L.M.N$.

(12) Hinc si $AB = LM$ et $AC = LN$ et $BC = MN$ erit $A.B.C \propto L.M.N$ per 10 et 11.

15 01 bot



[Fig. 1]

(13) Pars rectae est recta, nam cum recta sit via determinata, erit per determinata. Itaque si $AD + DB \propto AB$ erit AD recta et DB recta. Seu si ADC . recta erit AD recta.

02.018_L

(14) Omnis recta produci potest. Sit recta AB dico eam produci posse in C . Sumatur in AB punctum D utique recta AD produci potest; (producta est enim reapse in B) ergo et recta AB , quae similis est rectae AD per artic. 6. produci poterit aliquousque ut in

20 02 top

1 f. potest E.A. (1) Recta rectae congruit sive $AB \propto CD$. Si Recta rectae sit aequalis erit ei congrua. Ut si $AB = CD$ (a) erit (b) cum sit (c) sequitur $AB \propto CD$. quia AB (2) (6) Recta L 2–5 et contra ... $AC \sim LN$ erg. L 6 f. $AB \propto CD$. (1) nam patet (2) nam pa (3) sequitur ex axiomate sequenti (4) Nam L 13 E.A. $\propto$ YA (1) (11) Si $E.A \propto Y.A$. et $E.B \propto Y.B$. erit A (2) | Hoc *nicht gestr.* | intelli (3) Hoc L 18 f. (13) pars ... $AD + (1) DC \propto AC$ (2) $DB \propto AB$... et | DC *ändert Hrsg.* | recta ... AD recta erg. L 22 per artic. 6. erg. L 22–288,2 in C. (1) In notis sit AB recta. sumatur ADB recta. Ergo AD recta. Ergo $AD \sim AB$. Ergo datur et $ADB \sim ABC$. Ergo (a) ABC (b) per artic. 6. ABC est etiam recta (2) In L

C.

In notis: Datur AB recta. Ergo datur ABC recta. Probatur. Nam datur AB recta. Ergo datur ADB recta. Ergo (per artic. 13) AD recta. Ergo per (artic. 6) $AD \sim AB$.

02 mid (15) Jam similia similiter tractari possunt et similiter tractata dant similia, quod est
5 axioma a nobis saepius adhibendum.

Ergo quia datur ADB dari etiam poterit $ABC \sim ADB$. Et quia ADB recta est ex hypothesi erit (per 6) etiam ABC recta. Itaque producta est recta AB . Quod fieri posse erat demonstrandum.

(16) Punctum in recta sumtum ad duo alia puncta in eadem recta sita determinate
10 se habet, seu sui situs unicum est.

Sit recta $ALMNB$ dico aliquod ex punctis mediis ut N esse sui situs unicum ad puncta L et M . Nam $N.A.B$ est situs determinatus ex natura rectae, (seu N est situs sui ad A et B unicum) per artic. 4. Et eodem modo $M.A.B$ est determ. Et $L.A.B$ est determ.

02 bot 15 (17) Jam Axioma esto in situ aliquo pro puncto determinato substitui possunt puncta determinantia.

Itaque in situ determinato $N.A.B$ pro A substitui potest $M.B$ (quia A determinatur ex $M.B$. seu situs $M.A.B$ est determinatus) et fiet $N.M.B.B$, vel omissa inutili reduplicatione ipsius B fit $N.M.B$. qui etiam est determinatus. Similiter demonstrari potest
20 situm $N.L.B$. esse determinatum, itaque in situ $N.M.B$ pro B substituendo $N.L$. fiet denique $N.L.M$. situs determinatus, Q. E. D.

03-018 R

(18) Omne punctum sui situs unicum ad duo puncta, minusque distans ab utroque quam ea distant inter se cadit in rectam inter ea interceptam. Si sit $AC \cap AB$ et $BC \cap AB$ et $A.B.C$. determ. erit ACB recta, patet ex defin. rectae artic. 1. Forte tamen et
25 aliter demonstrari poterit; ex intersectionibus circulorum, ita ut definitionem rectae liceat assumere adhuc strictiorem in speciem, quae tamen idem efficiat.

03 top (19) Omne punctum sui situs unicum ad duo puncta cadit in rectam per ea duo puncta transeuntem, si opus productam.

3 (artic 6) $AD \propto AB$. Ergo (a) datur (b) dari potest (c) qvia datur ADB dari et potest ABC (aa) $\propto (bb) \sim AI$ (2) $\sim AB$. L 4 tractari ... similiter erg. L 8f. demonstrandum. (1) 15 Una recta (2) (16) punctum L 9f. determinate ... seu erg. L 10f. est. (1) Sit recta AB et in (2) Sit L 11 ut N (1) eodem modo se hab (2) esse (a) situs (b) sui L 14f. determ. (1) Ergo in situ $N.A.B$ pro (2) jam (a) in deter (b) Axioma esto (aa) pro |situ erg. u. gestr. | (bb) pro determinato semper substitui potest situs determ (cc) in L 17 determinato erg. L

Sint tria puncta $A. B. C$, quorum situs inter se sit determinatus, dico ea cadere in eandem rectam. Est enim aliquod ex ipsis medium, quod minus vel certe non magis distet a reliquis quam ipsa inter se. Quod sic ostendo, jungantur AB, BC, AC rectae et sit ex his maxima vel certe non minor ulla reliquarum AB , proxima vel certe non minor ultima sit AC , tertia seu nulla alia major sit BC . Patet C fore medium, seu non magis distare ab A et B , quam ea inter se. Ergo per praecedentem ACB erit recta. Itaque pro recta talem possumus habere propositionem localem. Sit $Y.A.B$ determ. et $\bar{Y}$ (seu locus omnium Y) erit recta. Hinc si duae rectae habere ponantur plus quam duo puncta communia coincident si opus productae et proinde duae rectae non habent segmentum commune, nec spatium claudunt.

03 mid

5

10

(20) Sequitur et locum omnium punctorum ad duo puncta unicum esse lineam, seu in viam puncti determinatam per duo puncta transeuntem incidere.

(21) Nam linea est via puncti.

(22) Planum est extensum ex tribus punctis determinatum, seu locus omnium punctorum sui ad tria puncta situs unicum. Seu si $Y.A.B.C$ determinatum est erit $\bar{Y}$ planum. Datis autem tribus quibusvis punctis non in eandem rectam cadentibus determinatur aliquid quod planum voco. Et generaliter assumtis quibuslibet aliquid determinatum est, seu ad ea determinate se habens.

15

(23) Tria puncta determinantia planum cadunt in ipsum planum. Nam situs ipsius A ad A est determinatus, ergo et situs ipsius A ad $A.B.C$.

03 bot

20

(24) Si duo puncta rectae sint in plano, ipsa recta est in plano. Sit recta $\bar{Z}.L.M$ et planum $\bar{Y}.A.B.C$. et L sit Y , itemque M sit Y . dico omne Z esse Y . Nam primo $L.A.B.C$ est determinatum, item secundo $M.A.B.C$. et tertio $Z.L.M$. Ergo in determinatione tertia pro L . et M ex determ. 1. et 2. substituendo determinantia, fiet $Z.A.B.C$ determinatum. Ergo omne Z est Y .

25

04-017_L

Hinc manifestum est omnem rectam omni plano ubique applicari posse; itemque

2 f. minus | vel ... magis *erg.* | distet (1) ab ipsis (2) a reliquis L 5 BC (1) jam si non cadunt in eandem rectam erit *dazu Figur, nicht gestr.*:

C •

A • • B (2) dico fore (a) AC (b) C istud (3) patet L 8–10 Hinc ... claudunt. *erg.* L

14 est (1) locus omnium punctorum (2) continuum | ex *nicht gestr.* | tri (3) extensum ... punctis | non in eandem rectam cadentibus *erg. u. gestr.* | determinatum L 15–19 planum. (1) (23) Si duo puncta rectae sint in plano, ipsa recta est in plano (2) | Datis ... habens *erg.* | (23) Tria L 19 ipsum planum (1) Nam $A.A.B.C$ determinatum est seu satis puncti (2) nam L 22 omne *erg.* L 22 primo *erg.* L 23 secundo *erg.* L 23 tertio *erg.* L 23 in determinatione tertia *erg.* L 24 ex determ. 1. et 2 *erg.* L 25 omne *erg.* L 26 plano (1) congruere (2) ubique L

rectam in plano posse moveri.

04 top

(25) Tria quaevis puncta in plano sumta idem planum determinant, seu punctum quodvis in plano sui ad tria plani puncta (non in eandem rectam cadentia) situs unicum est. Hoc potest demonstrari ad modum articuli 16 in recta. Item sic: Sint illa tria puncta
5 $L. M. N.$ dico ea determinare planum in quo sunt, nam determinare utique possunt aliquod planum si non cadant in rectam, et id planum est unicum, per artic. 22 et sunt in plano quod determinant per artic. 23. Ergo planum in quo sunt determinant.

04 mid

(26) Circumferentia circuli est locus in plano omnium punctorum quorum situs ad unum aliquod punctum sit idem seu describitur ab extremo rectae in plano motae (quod
10 fieri potest per artic. 24) uno puncto immoto. Et notis ita designabitur: Si $YA = BA$ in plano, $\bar{Y}$ est circumferentia circuli.

(27) Omne planum plano simile est si indefinite sumantur, (seu si duorum planorum ambitus sint congrui ipsa plana congrua sunt) nam si planum determinatur per $A.B.C$ sumantur in alio plano puncta $L. M. N$ sic ut sit $L.M.N. \sim A.B.C$, erit et determinatum per $L.M.N.$ simile determinato per $A.B.C.$ eo scilicet sensu quo determinationem explicuimus.
15

04 bot


(28) Si planum a plano secetur, sectio communis est recta. Si duo plana se secant, saltem plus quam unum punctum commune habent, sumamus ergo duo puncta communia A et B . Et in uno plano $\bar{Y}$ sumamus tertium C , in altero plano $\bar{Z}$ tertium L . et pro plano
20 $\bar{Y}$ erit $Y.A.B.C$ det. pro plano $\bar{Z}$ erit $Z.A.B.L$ determ. Sit jam recta $\bar{V}$ ita ut sit $V.A.B$ determ. dico omne V fore Z et omne V fore Y . Nam si $V.A.B$ determ. Ergo et $V.A.B.C$ determ. et $V.A.B.L$ determ. Ergo V est Y et V est Z . seu V cadit et in $\bar{Y}$ et in $\bar{Z}$. Verum nullum praeterea aliud punctum his duobus planis commune dari potest, quod non in hanc rectam cadit. Nam si tria puncta in eandem rectam non cadentia communia forent,
25 coinciderent duo plana, talia enim tria puncta planum determinant.

05-079 R

(29) In plano locus omnium punctorum eodem modo se ad duo puncta habentium

4 sic: (1) Cum $\langle$ enim ut $\rangle$ punctum (2) ex tribus (3) planum ex tribus punctis determinatum est unicum per artic. 22. $\langle$ — $\rangle$ a (4) sint L 6 si ... rectam erg. L 7 per artic. 23 erg. L 8 (26) (1) Si recta uno (2) Recta est locus omnium pl (3) Circumferentia L 11 f. circuli (1) possem demonstrare qvod omne planum sit plano simi (2) (27) Omne (a) planum indefinite (b) planum L 12 si (1) termini (2) duorum L 17 recta. (1) Sint (2) Sit $Y.A.B.C$ determ. et (a) $Y.Z.A.B$ (b) $Z.A.B.Y$ determ. planum (3) si L 18 habent, (1) hoc punctum (2) sumamus L 20 determ. (1) ergo commune (a) utrob $\langle$ — $\rangle$ erit (b) ambobus erit recta determinata per $A.B.$ (2) Sit L 22 V est Z . (1) Qvod erat demonstrandum (2) seu L 22 in $\bar{Z}$. (1) Qvod erat dem (2) Verum L

est recta seu sit $YL = YM$ erit $\bar{Y}$ recta.



[Fig. 2]

Sint duo puncta in loco proposito, nempe A et B quorum unumquodque se eodem modo habeat ad L quo ad M , etiam quod ipsis determinatur eodem modo se habebit ad L quo ad M . nempe recta $\bar{Y}.A.B$. Nullum autem aliud tale punctum datur, quod non sit in hac recta, esto enim tale punctum H quod non cadat in rectam AB . Cumque ex punctis A, B, H , quippe non in eandem rectam cadentibus determinetur totum planum, sequeretur totum planum eodem modo se habere ad L quo ad M , quod est absurdum, vel ideo quia sequeretur ipsum M eodem modo se habens ad L quo ad M , id est coincidere cum L , quia coincidit cum M , contra Hypothesin. Dantur autem plura quam duo puncta eodem modo se habentia ad L et ad M . Nam si circuli centris L et M , radiis LM describa[n]tur, se secabunt et quidem in duobus punctis, quia unus est partim intra alium partim extra. Sed de his mox.

(30) Eodem modo demonstrabitur locum omnium punctorum eodem modo se habentium ad duo data puncta esse planum.

(31) Hinc ex artic. 31 sequitur planum indefinite protensum a recta indefinite protensa secari in duas partes indifferentes. Et ex 31 similiter spatium secari a plano. Sed haec distinctius ostendenda.

1+3 $\bar{Y}$ recta (1) Sint (a) duo puncta A et B (b) tria puncta A, B, C in loco proposito et sit $YA = YM$, itemque $YB = YAL = AM$ et $BL = BM$, sit denique tertium punctum C et sit $CL = CM$ dico in plano $A.B.C$ esse determinatum (2) Sint L 3 A et B (1) eodem modo se habentia ad (2) quorum L 11 ad M . (1) quod (2) nam (3) nam (a) si circulus centro L radioque (b) si (aa) circulus centro L radio (bb) circuli L 13 f. mox. (1) (30) Eodem (2) (30) Si punctum ita moveatur in superficie, ut partem eius (a) ubique abscindat a reliquo (b) terminatam abscindat ubique a reliquo (aa) linea motus (bb) punctum redit omnibus (cc) mobile percursis punctis linea abs (dd) In priorem locum (aaa) percursis (bbb) postremo redibit, seu describet lineam recurrentem. Vel omnis superficiei tota linea extima sive ambitus, est in se recurrens (3) (30) L 14 f. se (1) in plano habentium esse ad duo aliqua data punct (2) habentium L 16 sequitur (1) rectam (2) planum L 17 partes (1) eodem m (2) indifferentes. (a) sumto enim puncto in una parte (b) Et ex 31 similiter (aa) planum secari a recta in duas partes indiff (bb) spatium L

05 bot

(32) Recta rectam indefinita indefinitam secatur in duas partes, quarum qualibet eodem modo se habet ad secantem.

Sit recta $\overline{Y}$ et recta $\overline{Z}$ et B sit Y item B sit Z . Rursusque sit $\overline{Z} \oslash \overline{V} + \overline{X}$ (vel omne Z sit V vel X) et aliq. V sit B et aliq. X sit B dico fore $\overline{Y}.\overline{V} \oslash \overline{Y}.\overline{X}$.

1 (32) | Omnis *gestr.* | Recta rectam | indefinita indefinitam *erg.* | secatur L 2f. secantem. (1) Sit recta $\overline{Y}$ et aliq. recta $\overline{Z}$ (a) et aliq. Z (et al.) Y (b) et B sit Z item B sit Y (2) Sit L